

副作用家庭须知：ALPHA-2 兴奋剂

CLONIDINE (Catapres)、EXTENDED RELEASE CLONIDINE (Kapvay)、GUANFACINE (Tenex)、EXTENDED RELEASE GUANFACINE (Intuniv)

药物名称： _____

药物剂量： _____

用于治疗下列状况：

- ADHD（注意力缺陷和多动症）或 ADD
- 过度活跃/冲动行为
- 暴怒和发脾气
- 抽搐障碍（运动抽搐减少）
- 睡眠问题
- 高血压

副作用包括但不限于：

- 镇静
- 心率和/或血压降低
- 头疼
- 口干
- 头晕
- 便秘
- 突然停药后反弹高血压（切勿突然停药）

罕见但严重的副作用包括但不限于：

- 极大降低心率或血压，尤其是出现过量情况时（请将其放在远离儿童的位置）

管理：

- 如果无法吞服，则速释药剂（Catapres、Tenex）可以碾碎并混合少量柔软的食物，如酸奶、蜂蜜、苹果酱或果酱，并须立即服用。
- 这些药物的长效型（Kapvay、Intuniv）能持续 10 至 12 小时。缓释药剂必须整颗吞服。

其他信息：

- 其可能需要 1 至 2 周或更长时间达到预期效果，且药物的剂量可能会每周逐渐增加，直至达到预期效果。
- 停药时，这些药物必须逐渐减少，以避免高血压反弹

在随后的就诊中应对副作用进行监督。如果您有任何问题或疑问，请尽快联系我们。