

## 副作用家庭须知： ATOMOXETINE (STRATTERA)

药物剂量： \_\_\_\_\_

用于治疗下列状况：

- ADHD（注意力缺陷和多动症）或 ADD
- 常用于兴奋剂有明显副作用，或同时存在焦虑时

药物类型：选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI）

副作用包括但不限于：

- 减重、食欲降低
- 恶心、呕吐、腹痛
- 头疼
- 头晕
- 易怒
- 镇静、疲劳
- 提高血压、提升心率
- 抽搐或反常运动

罕见但严重的副作用包括但不限于：

- **不良心脏（心血管）活动包括突然死亡。**如果个人或家庭有心脏病史，包括心率异常（延长QT综合征）或结构性心脏疾病（尤其是由于心血管/心脏原因造成的猝死），请告知您的提供商，在这种情况下，应在开始用药前进行筛检。
- 肝损伤（症状包括皮肤发痒、皮肤或眼白变黄、尿液变黑、右上腹部疼痛/压痛、不明原因的“流感样”症状）
- 阴茎异常勃起（勃起持续时间超过4小时）
- 情绪改变或易怒
- **思维模式改变，增加了自杀想法的风险**

管理：

- 以胶囊方式盛放的药物应整颗吞服。其在早晨或晚上服药均有效，但通常如果在早晨服用效果更好。Strattera的药效能够持续至少10至12小时。
- 其需要花费一些时间累积到生效的剂量，并且有些效果可以在1至4周内显现，并可能需要6至12周达到预期效果。**因此，最重要的是每日按时服药。**
- 如果您想停止用药，请告知您的提供商。最好能逐步停药，以避免出现戒断症状。

在随后的就诊中应对副作用进行监督。如果您对潜在副作用有任何问题或疑问，请尽快联系我们。