

副作用家庭须知： 神经毒理学/第二代抗精神病药

RISPERIDONE (Risperdal)、ARIPRAZOLE (Abilify)、QUETIAPINE (Seroquel)、OLANZAPINE (Zyprexa)、ZIPRASIDONE (Geodon)、PALIPERIDONE (Invega)、LURASIDONE (Latuda)

药物名称： _____

药物剂量： _____

用于治疗下列状况：

- 攻击性和易怒，尤其是自闭症儿童
- 自我伤害行为
- 抽搐障碍和刻板印象
- 双相情感障碍
- 精神分裂症或精神病

副作用包括但不限于：

- 镇静、嗜睡、混乱、记忆问题
- 头疼
- 口干、视线模糊（抗胆碱能作用）
- 便秘或腹泻
- 增加食欲并增重，存在发生“代谢综合征”（代谢综合征包括糖尿病、高胆固醇和高甘油三酯）的风险
- 焦虑或不安
- 肌张力异常反应（头部/颈部/躯干/四肢/眼睛的非自愿肌肉收缩）
- 直立性低血压（站立时血压下降）伴头晕、心动过速（心跳加快）或晕厥（晕倒）
- 由于泌乳素升高，女性无月经（经期）
- 泌乳素升高引起的乳汁溢液（乳头溢液）
- 泌乳素升高引起的妇科疾病（男性乳腺组织增加）

罕见但严重的副作用包括但不限于：

- **迟发性运动障碍：**长时间服用药物后可能发生的面部和身体的不自主重复运动（如眨眼、打嘴唇等）
- **不良心脏（心血管）活动：**如果个人或家庭有心脏病史，请告知您的服务商，包括心率异常（延长QT综合征），在这种情况下，在开始用药前需要进行筛选。
- 神经衰弱性恶性综合征（NMS）：肌肉僵硬、发热、谵妄、心率变化
- 白细胞数量变化
- 肝损伤伴随肝功能异常
- 癫痫
- 白内障
- 超过敏反应（严重过敏反应）

其他信息：

- 这些药物旨在快速生效，能在 1 至 2 周内起到积极的效果。
- 很重要的一点是要每天服药，以达到预期效果。
- 由于存在戒断症状，切勿在未与您的医疗提供商沟通前，中断服药。

（接下页）

- z在开始用药前，应完成下列实验室工作
 - 空腹血脂和葡萄糖
 - 糖化血红蛋白（如果葡萄糖水平高）
 - 完整代谢组合（CMP）
 - 全血细胞差异（CBC 差值）
- 此后每 6 个月将采集一次血脂和葡萄糖
- CMP 和 CBC 差此后将每年采集 1 次
- 无症状患者的泌乳素可能升高，如果出现症状，则应暂停泌乳素水平测量。

在随后的就诊中应对副作用进行监督。如果您对潜在副作用有任何问题或疑问，请尽快联系我们。