

가족을 위한 부작용 정보: 알파-2 작용제

클로니딘(Catapres), 서방성 클로니딘(Kapvay), 구안파신(Tenex), 서방성 구안파신(Intuniv)

약물 이름: _____

약물 복용량: _____

다음 상태의 치료에 사용됨:

- ADHD(주의력 결핍 및 과잉 행동 장애) 또는 ADD
- 과잉 행동/충동 행동
- 감정 분출과 짜증
- 틱 장애(운동틱 감소)
- 불면증
- 고혈압

부작용에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.

- 진정
- 심박수 및/또는 혈압 감소
- 두통
- 구강 건조
- 현기증
- 변비
- 약물의 갑작스러운 중단 시 반동성 고혈압 (**갑자기 중단하지 마십시오**)

드물지만 심각한 부작용에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.

- 심박수 또는 혈압의 급격한 감소, 특히 과다 복용 상황에서 우려됨 (**어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오**)

투여:

- 삼킬 수 없는 경우 속방성 제제(Catapres, Tenex)를 부수고 즉시 먹어야 하는 요구르트, 꿀, 사과 소스, 잼 등 소량의 부드러운 음식과 함께 섭취할 수 있습니다.
- 이러한 약물(Kapvay, Intuniv)의 효과는 10~12시간 동안 지속됩니다. 서방성 제제는 통째로 삼켜야 합니다.

기타 정보:

- 원하는 효과를 얻는 데 1~2주 이상 걸릴 수 있으며, 원하는 효과를 얻을 때까지 약물 용량을 매주 상향 조정해야 할 수 있습니다.
- 이러한 약물은 투여를 중단할 때 점차 줄여서 반동성 고혈압을 피해야 합니다.

부작용은 다음에 방문할 때 모니터링합니다. 질문이나 우려 사항이 있는 경우 더 빨리 저희에게 연락하십시오..