

## 가족을 위한 부작용 정보: 아토목세틴(스트라테라)

약물 복용량: \_\_\_\_\_

다음 상태의 치료에 사용됨:

- ADHD(주의력 결핍 및 과잉 행동 장애) 또는 ADD
- 각성제에 심각한 부작용이 있거나 불안이 공존하는 경우에 자주 사용됨

약물 유형: 선택적 노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRI)

부작용에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.

- 체중 감소, 식욕 감소
- 메스꺼움, 구토, 복통
- 두통
- 현기증
- 자극과민성
- 진정, 피로
- 혈압 상승, 심박수 증가
- 틱 또는 비정상적인 움직임

드물지만 심각한 부작용에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.

- **돌연사를 포함한 심장(심혈관) 이상사례.** 비정상적인 심장 박동(장기 QTc 증후군) 또는 구조적 심장 질환(특히 심장 원인으로 인한 조기 돌연사)을 포함한 심장 질환의 개인력이나 가족력이 있는 경우 의료서비스 제공자에게 이야기해주시요. 그러한 경우에는 이 약의 투여를 시작하기 전에 검사가 필요합니다.
- 간 손상(징후는 가려운 피부, 피부 또는 눈 흰자위의 황변, 진한 새끼의 소변, 오른쪽 상복부 통증/압통, 설명할 수 없는 “독감과 유사한” 증상일 수 있음)
- 지속발기증(4시간 이상 지속되는 발기)
- 기분 변화 또는 자극과민성
- 자살 충동을 느끼는 생각의 위험이 증가하는 사고 패턴의 변화

투여:

- 이 약은 캡슐 형태로 되어 있어 통째로 삼켜야 합니다. 아침이나 저녁에 복용하면 효과적이지만, 일반적으로 아침에 복용하면 더 효과적입니다. Strattera는 10~12시간 이상 효과가 있습니다.
- 효과적인 복용량에 도달하는 데는 시간이 걸립니다. 일부 효과는 1주에서 4주 내에 나올 수 있지만, 원하는 효과를 얻으려면 6주에서 12주 정도 걸릴 수 있습니다. 따라서 매일 복용하는 것이 중요합니다.
- 약물 투여를 중단하려면 의료서비스 제공자에게 이야기하십시오. 금단 증상을 피하려면 서서히 줄여가는 가장 좋습니다.

부작용은 다음에 방문할 때 모니터링합니다. 부작용 가능성에 대한 질문이나 우려 사항이 있는 경우 더 빨리 저희에게 연락해주시요.