

가족을 위한 부작용 정보:

선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)

설트랄린(졸로프트), 플루옥세틴(프로작), 시탈로프람(실렉사), 에스시탈로프람(렉사프로), 플루복사민(루복스), 파록세틴(팍실)

약물 이름: _____

약물 복용량: _____

다음 상태의 치료에 사용됨:

- 우울증 또는 기분 장애
- 불안 장애
- 강박 장애
- 섭식 장애
- 파괴적 기분 조절 장애

이러한 약물의 부작용에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.

- 메스꺼움, 구토, 변비, 설사, 체중 증가
- 졸음/진정, 불면증
- 활성화(특히 프로작)
- 현기증, 떨림, 두통
- 구강 건조, 흐릿한 시야(항콜린작용성 증상)
- 기분 변화, 불안
- 피부 질환(발진, 가려움증)
- 심장이 마구 뛴

드물지만 심각한 부작용에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다.

- 세로토닌 증후군(발열, 초조, 발한, 떨림, 발작)
- 우울증 악화, 기분 상승/경조증
- 멍이 드는 위험 증가
- 심장(심혈관) 이상사례 - (특히 실렉사)
비정상적인 심장 박동(장기 QTc 증후군)을 포함한 심장 질환의 개인력이나 가족력이 있는 경우 의료서비스 제공자에게 알려십시오. 이 경우 이 약의 투여를 시작하기 전에 검사가 필요합니다.
- 자살 생각(매우 가능성이 낮고 연구에서도 어떤 시도도 보고되지 않음)

투여:

- 자폐 스펙트럼 장애가 있는 어린이의 경우 이러한 약물은 종종 더 낮은 용량에서 효과적입니다. 따라서 낮은 용량으로 시작한 다음 필요에 따라 상향 조정합니다.
- 이 약은 음식과 함께 복용할 필요가 없습니다. 하지만 위장 장애가 있는 경우에는 음식과 함께 약을 복용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
- 이 약은 정기적으로 복용해야 합니다. 갑작스럽게 투여를 중단하면 금단 증상(메스꺼움, 피로, 오한, 근육통, 초조)이 생길 수 있습니다. 약 투여를 중단하고 싶으면 의료서비스 제공자에게 말씀하시면 투여량을 차츰 줄이는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

기타 정보:

- 일반적으로 심장 질환의 가족력이나 개인력이 있거나 환자가 QTc 간격을 연장할 수 있는 다른 약물을 복용하고 있는 경우가 아닌 한 이 약물의 투여를 시작하기 위해 환자를 사전에 검사할 필요가 없습니다. 심장 질환의 가족력이 있는 경우 의료서비스 제공자에게 알려십시오.
- 첫 주에도 약물의 효과가 있을 수 있지만, 약물의 치료 효과가 완전히 나오려면 2주에서 8주가 걸립니다.
- 부작용은 다음에 방문할 때 모니터링합니다. 부작용 가능성에 대한 질문이나 우려 사항이 있는 경우 더 빨리 저희에게 연락해주시요.