

## معلومات عن الآثار الجانبية للأسر: منشطات ألفا-2

CLONIDINE (Catapres), EXTENDED RELEASE CLONIDINE (Kapvay), GUANFACINE (Tenex),  
EXTENDED RELEASE GUANFACINE (Intuniv)

اسم الدواء:

جرعة الدواء:

يتم تناوله لعلاج الحالات الآتية:

- ADHD (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط) أو ADD
- اضطراب التشنجات اللاإرادية (انخفاض في حالة التشنجات اللاإرادية الحركية)
- سلوكيات مفرطة النشاط/ الاندفاع
- صعوبات النوم
- نوبات الغضب والتعصب
- ارتفاع ضغط الدم

تتضمن الآثار الجانبية على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- التخدير
- انخفاض معدل نبضات القلب و/ أو ضغط الدم
- الدوار
- الصداع
- الإمساك
- جفاف الفم
- ارتفاع ضغط الدم عند التوقف عن تناول الدواء بصورة مفاجئة (لا تتوقف بصورة مفاجئة)

تشتمل الآثار الجانبية النادرة والخطيرة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- انخفاض شديد في معدل نبضات القلب أو ضغط الدم، خاصةً القلق في حالة تناول جرعة زائدة (يُرجى الاحتفاظ به بعيدًا عن متناول الأطفال)

الإدارة:

- إذا لم تتمكن من ابتلاع الدواء، يمكن طحن المستحضرات فورية التحرر (Catapres, Tenex) وخلطها بكمية صغيرة من الأغذية اللينة مثل، الزبادي أو العسل أو عصير التفاح أو المربى التي يجب تناولها فورًا.
- يستمر تأثير الأنواع طويلة المفعول من هذه الأدوية (Kapvay, Intuniv) لمدة 10 إلى 12 ساعة. يجب ابتلاع المستحضرات بطيئة التحرر بالكامل.

معلومات أخرى:

- قد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر لتحقيق النتائج المرغوب فيها، وقد تحتاج جرعة الدواء إلى المعايرة بالزيادة أسبوعيًا حتى تتحقق النتائج المطلوبة.
- يجب تقليل جرعة هذه الأدوية في حالة التوقف عن تناولها لتجنب ارتفاع ضغط الدم الانتكاسي (ارتفاع ضغط الدم).
- سيتم مراقبة الآثار الجانبية في الزيارات التالية. لذا يُرجى الاتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف.