

معلومات عن الآثار الجانبية للأسر: ATOMOXETINE (STRATTERA)

جرعة الدواء:

يتم تناوله لعلاج الحالات الآتية:

- ADHD (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط) أو ADD
- يستخدم هذا الدواء غالبًا عند وجود آثار جانبية ملحوظة للمنشطات أو عند وجود قلق مترام

نوع الدواء: مثبطات امتصاص النوربينفرين الانتقائية (SNRI)

تتضمن الآثار الجانبية على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- نقص الوزن، انخفاض الشهية
- الغثيان والقيء وألم في البطن
- الصداع
- الدوار
- الانفعال
- التخدير والإرهاق
- ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب
- التشنجات اللاإرادية أو الحركات غير الطبيعية

تشتمل الآثار الجانبية النادرة والخطيرة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- **ضربات القلب (القلب والأوعية الدموية)** بما في ذلك الوفاة المفاجئة. يرجى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في حالة وجود تاريخ شخصي أو عائلي لأمراض القلب، بما في ذلك ضربات القلب غير الطبيعية (متلازمة QTc طويلة المدى) أو أمراض القلب الهيكلية (لا سيما الوفاة المفاجئة المبكرة لأسباب ذات صلة بالقلب/الأزمة القلبية)، في هذه الحالة يتم إجراء الفحوصات قبل بدء تناول هذا الدواء.
- إصابة الكبد (الدلائل قد تكون حكة في الجلد، واصفرار الجلد أو بياض العينين، لون البول الداكن، ألم/تعب في الجزء الأيمن العلوي من البطن، وأعراض تشبه الأنفلونزا " بدون سبب)
- القساح (الانتصاب المستمر لمدة أكثر من 4 ساعات)
- التغير في الحالة المزاجية أو الانفعال
- التغير في أنماط التفكير مع ارتفاع خطر التفكير في الانتحار

الإدارة:

- يأتي هذا الدواء على هيئة كبسولة ويجب ابتلاعها كاملةً. إذا تم تناوله في الصباح أو المساء يكون فعالاً ولكنه يكون أكثر فعالية إذا تم تناوله في الصباح بوجه عام. يستمر مفعول Strattera لمدة 10 إلى 12 ساعة على الأقل.
- يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الجرعة الفعالة، وبينما يمكن ملاحظة بعض التأثيرات خلال 1 إلى 4 أسابيع، فقد يستغرق الأمر ما بين 6 إلى 12 أسبوعًا لتحقيق النتائج المطلوبة. لذا من الضروري تناوله كل يوم.
- يُرجى إخبار مقدم الخدمة الخاص بك إذا كنت تريد التوقف عن تناول الدواء. من الأفضل تقليل الجرعة من أجل تجنب أعراض الانسحاب.
- سيتم مراقبة الآثار الجانبية في الزيارات التالية. لذا يُرجى الاتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف ذات صلة بالآثار الجانبية المحتملة.