

## معلومات عن الآثار الجانبية للأسر: مضادات الذهان العصبية/ مضادات الجيل الثاني

RISPERIDONE (Risperdal), ARIPIRAZOLE (Abilify), QUETIAPINE (Seroquel), OLANZAPINE (Zyprexa),  
ZIPRASIDONE (Geodon), PALIPERIDONE (Invega), LURASIDONE (Latuda)

اسم الدواء:

جرعة الدواء:

يتم تناوله لعلاج الحالات الآتية:

- العنف والانفعال، خاصةً عند الأطفال المصابين بالتوحد
- سلوكيات إيذاء الذات
- اضطراب التشنجات اللاإرادية والتكرارات النمطية
- الاضطراب ثنائي القطب
- انفصام الشخصية أو الذهان

تتضمن الآثار الجانبية على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- التخدير والشعور بالنعاس والارتباك ومشاكل تتعلق بالذاكرة
- الصداع
- جفاف في الفم، ضبابية الرؤية (آثار مضادة للكولين)
- الإمساك أو الإسهال
- شهية متزايدة وزيادة الوزن مع خطر الإصابة "بمتلازمة التمثيل الغذائي" (تتضمن متلازمة التمثيل الغذائي على مرض السكر وزيادة الكوليسترول وزيادة الدهون الثلاثية)
- القلق أو الأرق
- ردود فعل خلل التوتر العضلي (انقباضات عضلية لا إرادية في الرأس/ الرقبة/ الجذع/ الأطراف/ العين)
- انخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف) مع الدوار أو عدم انتظام نبضات القلب (ضربات القلب السريعة) أو الإغماء (فقدان الوعي)
- انقطاع الحيض (الدورة الشهرية) عند الإناث بسبب زيادة مستوى البرولاكتين
- ثر اللبن (إفرازات من الحلمة) بسبب زيادة مستوى البرولاكتين
- التثدي (زيادة أنسجة الثدي لدى الذكور) بسبب زيادة مستوى البرولاكتين

تشتمل الآثار الجانبية النادرة والخطيرة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- خلل الحركة المتأخر: حركات لا إرادية ومتكررة للوجه والجسم ويمكن أن تحدث بعد تناول الأدوية طويلة المدى (على سبيل المثال، تحريك العين، الضغط على الشفاه، وما إلى ذلك)
- ضربات القلب (القلب والأوعية الدموية): يُرجى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان هناك تاريخ شخصي أو عائلي لأمراض القلب، بما في ذلك نبضات القلب غير الطبيعية (متلازمة QTc طويلة المدى)، وفي هذه الحالة يتم إجراء الفحوصات قبل بدء تناول هذا الدواء.
- متلازمة الذهان الخبيث (NMS): تصلب العضلات والحمى والذهيان والتغير في معدل نبضات القلب
- التغير في عدد خلايا الدم البيضاء
- إصابة الكبد بعمل اختبارات غير طبيعية لوظائف الكبد
- النوبات المرضية
- إعتام عدسة العين
- ردود فعل فرط الحساسية (ردود الفعل التحسسية الحادة)

معلومات أخرى:

- تميل هذه الأدوية إلى ظهور مفعولها سريعًا مع ملاحظة التأثير الإيجابي خلال أسبوع إلى أسبوعين.
- من الضروري تناول الدواء كل يوم لتحقيق التأثير المطلوب.
- غير مسموح بالتوقف عن تناول الدواء دون الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك وذلك بسبب خطر ظهور أعراض الانسحاب.

(المتابعة في الصفحة التالية)

- قبل بدء تناول الدواء، يمكن الحصول على الفحوصات المخبرية التالية
    - فحص جدول الدهون والجلوكوز أثناء الصيام
    - الهيموجلوبين A1c، في حالة ارتفاع مستوى الجلوكوز
    - فحص جدول التمثيل الغذائي الكامل (CMP)
    - تحليل صيغة الدم كاملة مع التفاوت فيها (CBC with Diff)
  - يمكن إجراء فحص جدول الدهون والجلوكوز كل 6 شهور فيما بعد
  - يمكن إجراء فحوصات جدول التمثيل الغذائي الكامل وتحليل صيغة الدم كاملة مع التفاوت فيها كل عام فيما بعد
  - قد يزيد مستوى البرولاكتين عند المرضى الذين لا يعانون من أي أعراض، ويحتفظ بقياس مستوى البرولاكتين عند ظهور الأعراض.
- سيتم مراقبة الآثار الجانبية في الزيارات التالية. لذا يُرجى الاتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف ذات صلة بالآثار الجانبية المحتملة.