

**معلومات عن الآثار الجانبية للأسر:
مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)**

**SERTRALINE (Zoloft), FLUOXETINE (Prozac), CITALOPRAM (Celexa), ESCITALOPRAM (Lexapro),
FLUVOXAMINE (Luvox), PAROXETINE (Paxil)**

اسم الدواء:

جرعة الدواء:

يتم تناوله لعلاج الحالات الآتية:

- الاكتئاب أو اضطراب الحالة المزاجية
- اضطراب القلق
- اضطراب الوسواس القهري
- اضطرابات الأكل
- اضطراب عدم انتظام الحالة المزاجية

تشتمل الآثار الجانبية المصاحبة لهذه الأدوية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- الغثيان، القيء، الإمساك، الإسهال، زيادة الوزن
- النعاس/التخدير أو الأرق
- النشاط (خاصةً Prozac)
- الدوار، الرعشة، الصداع
- جفاف في الفم، ضبابية الرؤية (أعراض مضادة للكولين)
- تغيير في الحالة المزاجية والشعور بالقلق
- مشاكل البشرة (الطفح الجلدي، الحكة)
- خفقان القلب

تشتمل الآثار الجانبية النادرة والخطيرة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- متلازمة السيروتونين (الحمى، والتوتر، التعرق، الرعشة، النوبات المرضية)
- تفاقم الاكتئاب، ارتفاع الحالة المزاجية/الهوس البسيط
- ارتفاع معدل خطر الإصابة بالكدمات
- ضربات القلب (القلب والأوعية الدموية) - (خاصةً Celexa)

يُرجى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان هناك تاريخ شخصي أو عائلي لأمراض القلب، بما في ذلك نبضات القلب غير الطبيعية (متلازمة QTc طويلة المدى)، وفي هذه الحالة يتم إجراء الفحوصات قبل بدء تناول هذا الدواء.

- التفكير الانتحاري (غير مُرَجَّح للغاية ولم تذكر الدراسات أي محاولات)

الإدارة:

- بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، هذه الأدوية غالبًا ما تكون فعالة ولكن بجرعات أقل. لذلك، تبدأ الجرعة بكمية أقل ثم يتم معايرتها بالزيادة حسب الضرورة.
- لا تحتاج هذه الأدوية إلى تناول الطعام معها. إلا أنه في حالة وجود أي اضطراب في المعدة، فقد يساعد تناول الدواء مع الطعام.
- يجب تناول هذا الدواء بصورة منتظمة. وقد يؤدي التوقف عن تناول الدواء بصورة مفاجئة إلى ظهور أعراض الانسحاب (الغثيان، والتعب، والقشعريرة، وألم في العضلات، والتوتر). لذا يُرجى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تريد التوقف عن تناول الدواء ويمكننا المساعدة في تقليل كميته.

معلومات أخرى:

- بشكل عام، ليست هناك ضرورة لفحص المرضى مقدمًا لبدء تناول هذا الدواء ما لم يوجد تاريخ عائلي أو شخصي لمرض القلب أو كان المريض يتناول أدوية أخرى قد تُزيد من فترة QTc. لذا يُرجى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في حالة وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب.
- على الرغم من أنه قد يكون يوجد بعض الآثار بسبب الدواء خلال الأسبوع الأول، إلا أن الأمر سوف يستغرق ما بين 2 إلى 8 أسابيع حتى يظهر التأثير العلاجي للدواء بالكامل.
- سيتم مراقبة الآثار الجانبية في الزيارات التالية. لذا يُرجى الاتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف ذات صلة بالآثار الجانبية المحتملة.