

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE EFECTOS SECUNDARIOS: ATOMOXETINA (STRATTERA)

DOSIS del medicamento: _____

USADO para el tratamiento de las siguientes afecciones:

- TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) o TDA (Trastorno por déficit de atención).
- Se suele usar cuando hay efectos secundarios significativos a los estimulantes o si se presenta ansiedad concomitante.

TIPO de medicamento: Inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina (SNRI).

Los EFECTOS SECUNDARIOS incluyen, entre otros, los siguientes:

- Pérdida de peso, disminución del apetito
- Náuseas, vómitos, dolor de vientre
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Irritabilidad
- Sedación, fatiga
- Aumento de la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca
- Tics o movimientos atípicos

Los efectos secundarios RAROS, pero GRAVES de estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes:

- **Eventos adversos del corazón (cardiovasculares) incluida la muerte súbita.** *Dígale a su proveedor si hay antecedentes familiares o personales de enfermedad cardíaca, incluidas arritmias (síndrome del QTc largo) o enfermedad cardíaca estructural (en especial, muerte súbita temprana por razones cardíacas o del corazón), se indican exámenes antes de comenzar a tomar esta medicación.*
- Lesión hepática (indicada por picazón en la piel, piel amarillenta o en el blanco del ojo, orina oscura, dolor/sensibilidad en la zona abdominal alta derecha, síntomas parecidos a una gripe sin explicación).
- Priapismo (erección que dura más de 4 horas).
- Cambios de humor o irritabilidad.
- **Cambios de los patrones de pensamiento con más riesgo de pensamientos suicidas.**

Administración:

- Este medicamento viene en formato de cápsula y debe tragarse entera. Es eficaz si se lo toma a la mañana o a la noche, pero suele ser más eficaz al tomarlo a la mañana. Strattera funciona de 10 a 12 horas como mínimo.
- Lleva tiempo que se acumule una dosis eficaz y, si bien se pueden ver algunos efectos de 1 a 4 semanas, alcanzar el efecto deseado puede tomar de 6 a 12 semanas. **Por lo tanto, es importante tomarla todos los días.**
- Coméntele a su proveedor si desea interrumpir el medicamento. Es mejor bajar la dosis gradualmente para prevenir los síntomas de abstinencia.

Los efectos secundarios se controlarán en las siguientes visitas. Contáctenos antes si tiene preguntas o dudas sobre los posibles efectos secundarios.