

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE EFECTOS SECUNDARIOS: INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (SSRI)

SERTRALINA (Zoloft), FLUOXETINA (Prozac), CITALOPRAM (Celexa), ESCITALOPRAM (Lexapro), FLUVOXAMINA (Luvox), PAROXETINA (Paxil)

NOMBRE del medicamento: _____

DOSIS del medicamento: _____

USADO para el tratamiento de las siguientes afecciones:

- Depresión o trastorno bipolar
- Trastornos de alimentación
- Trastorno de ansiedad
- Trastornos de conducta disruptiva
- Trastorno obsesivo-compulsivo

Los EFECTOS SECUNDARIOS de estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes:

- Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, aumento de peso
- Sequedad bucal, visión borrosa (síntomas anticolinérgicos)
- Somnolencia, sedación o insomnio
- Cambios de humor, ansiedad
- Activación (en especial con Prozac)
- Problemas en la piel (sarpullido, picazón)
- Mareos, temblores, dolor de cabeza
- Taquicardia

Los efectos secundarios RAROS, pero GRAVES de estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes:

- **Síndrome de la serotonina (fiebre, agitación, transpiración, temblores, convulsiones).**
- Empeoramiento de la depresión, mayor hipomanía/humor.
- Mayor riesgo de formación de hematomas.
- **Eventos adversos del corazón (cardiovasculares) — (en especial con Celexa).**

Dígale a su proveedor si hay antecedentes personales o familiares de enfermedades cardíacas, incluidas las arritmias (síndrome del QTc prolongado), en cuyo caso se indica la evaluación antes de comenzar a tomar el medicamento.

- Ideas suicidas (es poco probable, y no se informaron intentos en los estudios).

Administración:

- Para los niños con trastorno del espectro autista, estos medicamentos suelen ser eficaces en dosis bajas. Por lo tanto, se debe comenzar con una dosis baja y luego aumentarla según sea necesario.
- No es necesario tomar estos medicamentos con alimentos. Sin embargo, si se presenta malestar estomacal, puede ser útil tomar el medicamento con alimentos.
- **Este medicamento se debe tomar de forma regular. La interrupción abrupta puede generar síntomas de abstinencia (náuseas, fatiga, escalofríos, dolores musculares, agitación). Coméntele a su proveedor si desea interrumpir la medicación y podemos ayudarlo a disminuirla gradualmente.**

Otra información:

- Por lo general, no hay necesidad de analizar previamente a los pacientes para que comiencen a tomar este medicamento salvo que haya antecedentes personales o familiares de enfermedad cardíaca o que el paciente tome otros medicamentos que puedan prolongar el intervalo del QTc. Coméntele a su proveedor si hay antecedentes familiares de problemas cardíacos.
- Si bien pueden producirse algunos efectos de los medicamentos la primera semana, demorará entre 2 y 8 semanas para que el medicamento haga su efecto terapéutico pleno.
- Los efectos secundarios se controlarán en las siguientes visitas. **Contáctenos antes si tiene preguntas o dudas sobre los posibles efectos secundarios.**